

Buletin de informare

Conform Notificării ANSA nr. 11-4796/2026, în Republica Moldova a fost semnalată prima detectare oficială a speciei *Lycorma delicatula*, unător de carantină pentru Uniunea Europeană. Focarul a fost identificat pe una din plantele gazdă, cenușar-otetar (*Ailanthus altissima*) și supus măsurilor de eradicare.

Pentru România, aflată în proximitatea focarului, există un **risc de introducere și răspândire a dăunătorului** — motiv pentru care primăria producătorilor agricoli, depistarea timpurie a dăunătorului și raportarea imediată către Autoritatea Națională Fitosanitară sunt etape care pot face diferența dintre un focar izolat și o răspândire greu de eradicat.

Descrierea speciei

Lycorma delicatula, cunoscută internațional sub denumirea de *spotted lanternfly*, este originară din China, Taiwan și Vietnam și s-a extins anterior în Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Stadiu: Ou

Perioada: Octombrie – Mai

Corp de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție cenoasă, aspect de aronie, cu aspect de proi uscat și crăpat, puse pe scoarță sau pe frunze netede.




Lycorma delicatula (LYCMBE) - <https://gd.eppo.int>


Stadiu: Adult

Perioada: Iulie – noiembrie

Corp de aprox. 25 mm, negru, cu aripi maro închise, cu pete roșii și negre pe aripi. Cenușii cu pete roșii și negre pe aripi. Cenușii cu pete roșii și negre pe aripi. Cenușii cu pete roșii și negre pe aripi.



Lycorma delicatula (LYCMBE) - <https://gd.eppo.int>



Lycorma delicatula (LYCMBE) - <https://gd.eppo.int>

Stadiu: Nimfă I-III

Perioada: Mai – Iulie


Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.

Stadiu: Nimfă IV

Perioada: Iulie – August

Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.

Prin amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*) se pot captura indivizii care cad ușor din copaci.



Lycorma delicatula este un dăunător polifag care se hrănește în principal cu plante lemnoase, inclusiv vița de vie (*Vitis* spp.), pomi fructiferi (de exemplu, măr, păr, prun, etc), arbori ornamentali și forestieri (de exemplu, arțar, mesteacăn, plop, stejar, salcâm, salcie, etc). Planta-gazda preferată este cenușarul (*Ailanthus altissima*).

Dăunătorul se hrănește cu seva din floem determinând ofilirea lăstarilor, slăbirea generală a plantei și uscarea acestora. Excreția masivă de rouă de miere determină dezvoltarea fumaginei, reducând totodată și procesul de fotosinteză. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și uscarea butucilor de viță-de-vie.

Răspândirea dăunătorului pe distanțe lungi are loc prin transportul ouălelor: depunerea pontei pe plante și suporturi inerte care sunt transportate internațional (mase de ouă camuflate pe tulpini, ambalaje din lemn, palet, piatră de carieră, containere și vehicule). De acest motiv, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate reprezintă prima linie de apărare.

Raportați orice suspiciune la Oficiul Fitosanitar Neamt sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Oficiului Fitosanitar Neamt la
tel: 0233.231.661 e-mail: ofneamt@anf.ro

Coordonator Oficiul Fitosanitar Neamt
Chirila Nicoleta

